

飲むときに 注意すること



- お薬を飲むときは、両面アルミ包装（PTPシート）に「ミラペックスLA」と書かれている事を確認し、シートから取り出してください。ただし、飲む直前に取り出すようにしてください。
- 割ったり、砕いたりしないで、そのまま嚙まずにお飲みください。
- あやまって多く飲んでしまった場合には、すぐに主治医または薬剤師に連絡してください。
- 飲み方は必ず主治医の指示に従うようにし、指示なしに飲むのを止めないでください。



次のようなことが起こったら、 主治医に連絡を

お薬を飲んだあとに次のような症状がみられた人は、主治医に連絡してください。

- 1 前兆のない眠り込み
- 2 幻覚や妄想
- 3 めまいや立ちくらみ
- 4 発熱や意識がぼんやりした状態
- 5 筋肉のこわばりがひどい状態



病院・医院名


パーキンソン病治療で ミラペックスLA錠 を服用される患者さんへ

ビ・シフロール錠を 服用されていた患者さんへ

- ミラペックスLA錠は、ビ・シフロール錠と主成分が同じです。
- ミラペックスLA錠は、ビ・シフロール錠と1日に飲む量や回数が異なるお薬です。主治医の指示に従い、飲む量や回数を間違えないようご注意ください。

ミラペックスLA錠 について

- このお薬は、パーキンソン病の治療に使われるお薬です。
- ふるえや筋肉のこわばり、動作が遅くなる、姿勢の障害などを改善する働きがあります。



日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

主治医に伝え 忘れていませんか？



次のようなことがある人は、お薬を使う前に必ず主治医に相談してください。

- ☒ 以前に薬を飲んで、発疹(ほっしん)などが出たことがある人
- ☒ 妊娠または授乳中の人
- ☒ 以前に幻覚や妄想などの経験がある人
- ☒ 心臓や腎臓などの病気を患ったことがある人、または現在患っている人
- ☒ 低血圧の人
- ☒ 薬局で買った薬も含め、他に薬を使っている人


⚠ 注意してください ⚠

このお薬を飲むと、眠くなったり、前兆もなく急に眠り込んでしまうこと、また、めまいや立ちくらみ、ふらつきが起こることがあります。車の運転や危険を伴う機械の操作、高い場所での作業などは行わないでください。

ミラペックスLA錠の飲み方

このお薬は、はじめ少ない量からスタートし、少しずつ飲む量を増やしていく飲み方をします。お薬を飲む時間(食後)については主治医の指示に従い、できるだけ同じ時間帯に飲みましょう。

- ① 飲み始めの第1週目は、円形の0.375mg錠1錠を1日1回食後に飲みます。
- ② 第2週目は、円形の0.375mg錠2錠を1日1回食後に飲みます。
- ③ 第3週目は、だ円形の1.5mg錠1錠を1日1回食後に飲みます。
- ④ 第4週目からは、患者さんそれぞれの様子をみながら、主治医が飲む量を増やしていきます。



※ビ・シフロール錠からミラペックスLA錠にお薬が替わった患者さんは、上記の飲み方と異なります。詳しくは主治医にご確認ください。また、お手元にビ・シフロール錠が残っている場合は主治医にご相談ください。(残っているお薬は主治医の指示なしに飲まないでください)